

PROFILO GLICEMICO ORE 8:00, ORE 11:00, ORE 15:00

Il primo prelievo viene eseguito al mattino a digiuno. Il secondo viene effettuato sempre al mattino, intorno alle ore 11, dopo un'abbondante colazione (devono comunque trascorrere almeno due ore dal pasto). Il terzo ed ultimo prelievo, invece, è post-prandiale, ciò significa che viene eseguito al pomeriggio, dopo pranzo, in base alle indicazioni d'orario fornite dal medico prelevatore. Si tenga comunque presente che dovranno trascorrere almeno due ore dal momento del pasto.

PROLATTINA

Il prelievo deve essere eseguito a digiuno. Se è richiesta la prolattina oraria bisogna osservare, oltre al digiuno, un'ora di riposo prima del prelievo. Sospendere, in accordo con il medico curante, l'uso di farmaci nei due giorni precedenti all'esame.

Tampone faringeo

Per l'effettuazione dell'esame è indispensabile che il paziente abbia sospeso la terapia antibiotica da almeno una settimana.

L'esame, normalmente, viene eseguito direttamente in Laboratorio strofinando un tampone di cotone sulle tonsille e sulla parete posteriore della faringe.

Tampone vaginale

Per l'effettuazione dell'esame è indispensabile che la paziente abbia sospeso la terapia antibiotica da almeno una settimana.

La paziente inoltre deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame e non deve essere in periodo mestruale. L'esame viene eseguito direttamente in Laboratorio nell'orario dei prelievi.

Tampone auricolare

Per l'effettuazione dell'esame è indispensabile che il paziente abbia sospeso la terapia antibiotica dai 3 ai 5 giorni. L'esame, normalmente, viene eseguito direttamente in Laboratorio strofinando un tampone di cotone sulle pareti del condotto uditivo.

NOTA BENE: i contenitori per la raccolta, i tamponi, i vetrini ecc. sono acquistabili in farmacia o reperibili gratuitamente presso la nostra struttura. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento il personale di accettazione e quello di laboratorio è a Vostra completa disposizione.